		SURVEILLANCE BIOLOGIQUE		
		Indication	**Quel test biologique prescrire ?**	**A quel moment prélever ?**
ANTICOAGULANTS	**AVK**	Surveillance au moins mensuelle, plus rapprochée selon contexte	INR	1er contrôle après la 3ème prise cad le 4ème jour du début du traitement puis tous les 2j jusqu'à stabilité INR dans la zone fixée Le 1er mois détermination hebdomadaire puis contrôle mensuel
	HNF traitement préventif	Systématique : numération plaquettaire +/- Surveillance de l'hémostase si risque de surdosage (insuffisance rénale majeure)	Numération plaquettaire Hémostase : TCA ou activité anti-Xa ss HNF (en cas d'anomalie préexistante du TCA, en réanimation et en cas de syndrome inflammatoire marqué)	**Numération plaquettaire** : avant traitement puis - 2 fois par semaine pendant 1 mois - 1 fois par semaine si le traitement > à 1 mois et jusqu'à l'arrêt du traitement **Hémostase** : - **Perfusion continue** : heure de prélèvement indifférente, mais de préférence 4-6 heures après modification de posologie - **Administration discontinue** : prélèvement à mi-temps entre deux injections o 4 heures après la dernière injection si 3 injections/24h o 6 heures après la dernière injection si 2 injections/24h
	HNF traitement curatif	Surveillance de l'hémostase et de la numération plaquettaire		
	HBPM traitement préventif	Surveillance non systématique : - Numération plaquettaire selon contexte (chirurgical et traumatique) - Hémostase en cas de surdosage, insuffisance rénale, poids extrêmes, hémorragie		**Numération plaquettaire** : avant traitement puis - 2 fois par semaine pendant 1 mois - 1 fois par semaine si le traitement > à 1 mois et jusqu'à l'arrêt du traitement
	HBPM Traitement curatif		Numération plaquettaire Hémostase : activité anti-Xa sous HBPM	**Numération plaquettaire** : avant traitement puis 2 fois par semaine pendant 1 mois puis 1 fois par semaine si le traitement se poursuit au-delà d'un mois, jusqu'à l'arrêt du traitement **Hémostase** : 3 à 4 heures après l'injection (après 48h de traitement)
	Arixtra Fondaparinux	Indication de surveillance en cas de suspicion de surdosage	Hémostase : activité anti-Xa spécifique **(non fait au CHB)**	**Hémostase** : 3 à 4 heures après l'injection (après 48h de traitement)
	Orgaran Danaparoide	Indication de surveillance de l'hémostase si insuffisance rénale ou obésité	Hémostase : Activité anti-Xa spécifique	**Hémostase** : à mi-temps entre deux injections
	AOD	Pas d'indication de surveillance systématique obligatoire y compris en chirurgie programmée Indication si pré-op **non programmé**, ou si hémorragie majeure.	Activité anti-Xa spécifique (Préciser Xarelto/Eliquis) ou activité anti-IIa spécifique (Pradaxa)	
ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES		Pas d'indication de surveillance systématique obligatoire En cas de mauvaise réponse, rechercher résistance aux antiagregants plaquettaires	VERIFY NOW Aspirine VERIFY NOW P2Y12 Envoi patient CHU Toulouse pour consultation hemostase	Prélèvement **en résiduel**, juste avant la prochaine prise après au moins 5 à 7 jours de traitement antiagrégant

Ce document ne doit être ni photocopié, ni imprimé sans l'autorisation de la cellule qualité. Seule la version électronique est valide.