



**PRECONISATIONS DE
PRELEVEMENT POUR BILANS DE
THROMBOPHILIE**

Indications : TVP ou EP **spontanée** avec 1^{er} épisode **avant 60 ans**

Bilan de première intention =

1 petit  + 4 tubes  + 2 grands tubes  + 2 tubes 

	Type de tube	Héparines	AVK	Apixaban Rivaroxaban Dabigatran
NFS		Green	Green	Green
TP, TCA, Fibrinogène		Green	Green	Yellow
AT		Red	Green	Red
PC, PS		Green	Red	Red
RPCA		Red	Green	Red
Mutations du gène du facteur V et du gène de la prothrombine (consentement)		Green	Green	Green
Anti beta2 GPI, Anticardiolipines		Green	Green	Green
Recherche et identification d'ACC lupiques		Red	Si INR < 3	Red

+ dosage d'homocytéine (possible quelque soit le traitement anticoagulant) **si enfant ou adulte jeune** et signes neurologiques



- Si thrombose de localisation inhabituelle (thrombose v.porte, infarctus mésentérique etc.)

1 petit  + 4 tubes  + 2 grands tubes  + 2 tubes  + 4 grands 

	Type de tube	Héparines	AVK	Apixaban Rivaroxaban Dabigatran
NFS				
TP, TCA, Fibrinogène				
AT				
PC, PS				
RPCA				
Mutations du gène du facteur V et du gène de la prothrombine (consentement)				
Anti beta2 GPI, Anticardiolipines				
Recherche et identification d'ACC lupiques			Si INR < 3	
Recherche de mutation de JAK2				
Recherche de clone HPN				