rappels INFECTION et PORTAGE :

Il existe un **portage asymptomatique de *Clostridioides difficile*** :

- env 3 % dans la population générale
- 30 % dans la population hospitalisée ou âgée
- 30 à 80 % chez les enfants < 3 ans (rôle pathogène non prouvé)

Infection à *Clostridioides difficile* (ICD)

Prévalence ~ 10% chez hospitalisés avec diarrhée

Critères diagnostiques :

- Colite pseudo membraneuse (d'autre étiologie dans 5%)
- ou tableau clinique compatible (diarrhée, ileus, mégacolon toxique) **ET** critères biologiques :
 - soit toxines positives dans les selles,
 - soit souche toxinogène **sans autre cause**

Précisions sur les INDICATIONS :

- **uniquement sur les selles diarrhéiques** afin de ne pas traiter des portages : **les prélèvements qui ne prennent pas la forme du pot sont annulés** au labo, sauf information particulière (recueil sur couche) transmise.
- **âge ≥3 ans** (sauf exceptions = maladie de hirschprung ou exploration épidémie)
- prélèvement **AVANT DEBUT de traitement**, car risque de faux négatif dès J1.
- **Pas de contrôle en fin de traitement** car persistance observée pendant plusieurs semaines chez des patients guéris :
Les critères de guérison sont uniquement cliniques

INTERPRETATION DE LA RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

F2-AN01-INTCDIFF - Version : 1 - Date d'application : 23/02/2022 - Page 2 sur 2
 LABORATOIRE COMMUN DE BIOLOGIE MEDICALE TARBES-LOURDES

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERPRETATION :

Aucun test diagnostique isolé ne permet actuellement d'affirmer le diagnostic d'ICD.

La recommandation est une **stratégie diagnostique en plusieurs étapes**, pour combiner sensibilité (dépistage) et spécificité (tests de confirmation). Nous utilisons l'association :

- **dépistage**, très sensible, par **GDH** (Ag de *Clostridioides difficile*)
- **confirmation** par méthodes très spécifiques :
 - o **toxines libres, dans les selles**
 - o **PCR** (Genexpert : **toxines B, toxine binaire** associée au clone 027 et délétion associée au ribotype 027, 1^{er} clone responsable d'épidémie.

1ère étape = dépistage : test GDH (à J0 en journée)

Si GDH nég, son excellente VPN permet **d'affirmer l'absence de C. diff dans les selles et donc d'ICD** (pas de recherche de toxines en PCR dans ces cas ; STOP)

2ème étape, si GDH + : recherche de toxines par 2 méthodes

2-1 détection de toxines libres dans les selles par ICT (immunochromatographie)

Sa positivité permet la **CERTITUDE étiologique d'ICD**

Elle est moins sensible que la PCR mais **correlée à la sévérité de l'infection**.

2-2 détection de toxines par PCR

Détecte les gènes de toxines B ou binaire, et la suspicion du clone 027

La PCR, plus sensible permet de détecter les toxines présentes en faible quantité : **l'ICD est PROBABLE** (on ne peut exclure un portage associé à autre cause de diarrhée en l'absence de détection de toxines libres)

INTERPRETATION :

		toxines libres (ICT)	
		-	+
PCR	-	Absence d'ICD C diff absent ou non toxigène	Exceptionnel (probable toxine A isolée, de faible pathogénicité)
	+	ICD ou portage : Evaluation clinique +++	ICD certaine (et plus sévère)

Références Biblio : - REMIC 2018 Référentiel en Microbiologie, p 537-538, Barbut et coll (CNR).
 - 2021 : webinars Remic's de la Société Française de Microbiologie, F Barbut